

让您的宫颈为分娩做好准备： 唯一获得FDA 批准的阴道插入式产品^{1,2}


有时，您的身体需要帮助才能为分娩做好准备。

CERVIDIL 是一种阴道插入式产品，它的功能与您的荷尔蒙通常产生的效果类似，可帮助您的宫颈成熟、变软和变薄。这将使胎儿能够通过产道。



取出线

可让医生或助产士
轻松取出 CERVIDIL
(就像卫生棉条)¹



(插入式产品以实际
尺寸展示)

**CERVIDIL 将由医生或助产士
在医院插入，并可在其认为合适
时轻松取出。**

提供荷尔蒙

(与您自己体内的荷尔蒙类似)
地诺前列酮，以帮助您的宫颈
变软、变薄并扩张¹

12 个小时内
逐步释放¹

适应症

CERVIDIL (地诺前列酮, 10 毫克) 是一种阴道插入式产品，它已获得批准，适用于正处在或接近分娩时刻或者因某种医疗原因而进行催(引)产的孕妇，旨在发起和/或保持孕妇的宫颈成熟过程。

在插入后的前两 (2) 个小时，您应保持躺卧姿势。如果您在前两小时后坐起或行走，应该小心，以确保插入式产品保持就位。在插入 CERVIDIL 后，医生将认真监测您的产程和胎儿的健康情况，并决定何时应该取出插入式产品。

重要安全信息

CERVIDIL 应只由接受过培训的医疗专业人员在适合分娩的医院环境下插入。

不应向哪些孕妇提供 CERVIDIL?

如果您存在以下状况，则不应向您提供 CERVIDIL:

- 对前列腺素 (某些荷尔蒙类物质) 出现过过敏反应
- 在妊娠期间出现过不明原因的阴道出血
- 已经开始服用催产药物
- 在一生中已生育过六次或以上

请认真查看“重要安全信息”以及随附提供的完整“处方信息”。

借助 **CERVIDIL** 使您的
宫颈做好准备，可能是迎
接宝宝到来的第一步。

常见问题

什么是 CERVIDIL?

CERVIDIL 是一种放置在宫颈附近的阴道插入式产品，带有一条较长的取出线。它将在给药位置以受控速率释放药物地诺前列酮，持续时间可长达 12 小时。¹一旦您的宫颈成熟，或者医生或助产士认为合适，就可以使用取出线方便地轻轻取出 CERVIDIL。

我为何需要 CERVIDIL?

医生或助产士可以根据您的以下状况而判断应当使用 CERVIDIL：您已到或已过预产期；您的羊水已经破裂，但您的身体仍未开始分娩过程；或者因医疗需要，必须开始您胎儿的分娩过程。¹

为何我的宫颈需要为分娩做好准备?

当宫颈变软、变薄并扩张时，胎儿随后即可通过您的产道。CERVIDIL 是唯一获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准，旨在帮助您的宫颈为分娩做好准备的产品。^{1, 2}

www.CERVIDILinfo.com

重要安全信息 (续)

如果医生确定存在以下情况，则也不应向您提供 CERVIDIL：

- 胎儿处于窘迫状态，因而需要紧急分娩
- 胎儿的头部或躯干可能太大而无法通过您的骨盆（称为“头盆不称”）
- 用于催产的药物不适用于您，或者持续宫缩可能对您或您的胎儿造成伤害，如您曾有既往剖宫产史或对子宫动过手术。

与使用 CERVIDIL 相关的最严重的风险是什么?

催产一直与凝血异常病症的风险提高有关，这可能会导致产儿后立即大量出血（称为“弥散性血管内凝血”，简称 DIC）。对于 30 岁以上、妊娠期间出现并发症以及孕期已持续 40 周以上的妇女而言，这种风险更高。

在极少数情况下，使用 CERVIDIL 与发生称为“羊水栓塞”的危及孕妇生命事件的风险提高有关。我们对于导致羊水栓塞的原因并不十分清楚，但据信可能是因为在一些羊水或其他物质进入您血液，随后开始发生可能导致心脏衰竭和肺萎陷的严重反应。

在开始催产或接受 CERVIDIL 治疗之前，我应该和医生讨论哪些问题?

与在整个妊娠期间一样，您应该确保将自己服用的所有处方或非处方药物的情况告诉医生。在接受 CERVIDIL 治疗之前，您应该确保将目前所患疾病和既往病史的情况告诉医生，包括：

CERVIDIL 如何发挥作用?

CERVIDIL 经过专门设计，可以直接作用于您的宫颈，帮助使其变软、变薄并扩张。当医生或助产士认为合适时，可以使用较长的取出线迅速取出 CERVIDIL（就像卫生棉条）。¹

CERVIDIL 是否与缩宫素或催产素相同?

不，CERVIDIL 用于使宫颈成熟，但有可能引起轻度宫缩。而缩宫素或催产素用于产生或加强现有宫缩。

我的宫颈为何不能自行成熟?

有时，您的身体需要帮助，因其无法产生足够的地诺前列酮，一种可使身体为分娩做好准备的荷尔蒙。医生或助产士可以确定是否需要借助 CERVIDIL。

CERVIDIL 是否适合我?

在美国已使用了超过 5 百万个 CERVIDIL 阴道插入式产品。³请查看下面的“重要安全信息”，并与医生或助产士讨论；只有他/她能够确定 CERVIDIL 是否适合您。

- 羊水曾经破裂
- 在妊娠期间出现过任何不明原因的阴道出血
- 所有子宫手术的情况，尤其是上一次剖宫产或子宫手术的情况
- 有持续 2 分钟以上的宫缩史
- 青光眼
- 哮喘，即使您曾罹患儿童期哮喘，但成年后哮喘从未发作

CERVIDIL 最常见的副作用有哪些?

对于施用 CERVIDIL 而言，最常见的相关副作用包括宫缩发生频率高于正常频率（宫缩过频），以及胎儿出现疲惫迹象或处于窘迫状态（子宫亢进）。在临床试验中，这些副作用在使用 CERVIDIL 的妇女中单独或共同发生的比例不到二十分之一。

在临床试验中，在使用 CERVIDIL 的妇女中发现发烧、恶心、呕吐、腹泻、腹痛现象的比例不到百分之一。

这里并未完整地列出所有可能出现的副作用。

参考资料：1. Cervidil [药品说明书]。Parsippany, NJ: Ferring Pharmaceuticals Inc. 2. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 橙皮书。http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/tempai.cfm。已于 2015 年 8 月 17 日查阅。3. 归档数据。Ferring Pharmaceuticals Inc.

请认真查看“重要安全信息”以及随附提供的完整“处方信息”。