


這是唯一獲得美國食品和藥物管理局批准的為您的子宮頸準備分娩的陰道插入式產品^{1,2}

有時候您的身體需要幫助做好分娩的準備。CERVIDIL 是一種陰道插入式產品，可以幫助您的子宮頸成熟、軟化、變薄，與您的荷爾蒙通常的作用類似。可以使胎兒通過產道。



拉繩

讓您的醫生或助產士輕鬆移除 CERVIDIL (就像衛生棉條一樣)¹



(插入式產品以實際尺寸顯示)

CERVIDIL 是在醫院由您的醫生或助產士插入，也很容易在他們認為適當的時候移除。

提供荷爾蒙 類似於您自身的荷爾蒙，地諾前列酮 (dinoprostone)，幫助您的子宮頸軟化、變薄、擴張¹

逐漸釋放 在 12 小時期間¹

適應症

CERVIDIL (地諾前列酮，10 毫克) 是一種已獲批准的陰道插入式產品，用於開始和/或繼續促進正在分娩或即將分娩以及由於醫療原因需要引產的孕婦子宮頸的成熟。

在插入後的前兩 (2) 個小時，您應該保持平躺。如果您在這兩個小時以後坐起來或走動，您應該小心確保插入式產品保持在原位。當插入 CERVIDIL 時，您的醫生將會仔細監測您的進展以及您胎兒的健康，並決定何時應移除插入式產品。

重要安全須知

CERVIDIL 只應在適合分娩的醫院由受過訓練的醫療保健專業人士插入。

誰不應使用 CERVIDIL ?

如果您有以下情況，就不應該使用 CERVIDIL：

- 對前列腺素類 (某些類似荷爾蒙的物質) 有過敏反應
- 在您懷孕期間有過原因不明的陰道出血
- 已經開始用藥引產
- 之前已生育了六胎以上

請參看全部的《重要安全須知》以及內附的完整處方資訊。

使用 **CERVIDIL** 讓您的子宮頸做好準備，邁出迎接寶寶的第一步。

常見問題

CERVIDIL 是什麼？

CERVIDIL 是一種陰道插入式產品，在子宮頸附近留有一條方便抽出的長拉繩。它會在那裡以一種可控的速率持續長達 12 小時釋放藥物——地諾前列酮。¹一旦您的子宮頸已經成熟或當您的醫生或助產士認為是時候了，就可以緩緩地抽出拉繩輕鬆移除 CERVIDIL 了。

我為什麼需要 CERVIDIL？

您的醫生或助產士會決定適合使用 CERVIDIL 的時候，因為您到了預產期或已過預產期；您的羊水已經破了但您的身體還沒有開始分娩，或者因為醫療原因需要立即接生您的胎兒。¹

我的子宮頸為什麼需要為分娩做好準備？

當子宮頸軟化、變薄和擴張時，胎兒就能通過您的產道出生。CERVIDIL 是唯一獲得美國食品和藥物管理局批准的幫助您的子宮頸準備分娩的陰道插入式產品。^{1,2}

www.CERVIDILinfo.com

重要安全須知（續）

如果您的醫生已經確定以下情況，您也不應該使用 CERVIDIL：

- 您的胎兒處於窘迫，需要立即分娩。
- 胎兒的頭部或身體可能太大了，不適合通過骨盆（「頭盆不稱」）
- 例如，如果您先前有過剖腹產或子宮手術，用於引產的藥物則不適合您或延長子宮收縮的藥物對您或您的胎兒有害。

使用 CERVIDIL 有哪些最嚴重的相關風險？

引產與異常凝血障礙風險的增加有關，可能會導致產後立即大出血（「彌散內血管內流血」[DIC]）。30 歲以上的婦女、那些在懷孕期間有併發症的人以及那些懷孕超過 40 週的人風險較高。

在少數情況下，使用 CERVIDIL 也有可能增加一種會危及母體生命的事件，稱為「羊水栓塞」的風險。羊水栓塞的原因還不是很清楚，但人們認為是羊水或其他物質進入您的血液中所引發的可能導致心肺萎陷的嚴重反應。

在開始引產或使用 CERVIDIL 之前我應該和醫生討論些什麼？

在整個懷孕期間，請切記告訴您的醫生您所使用的所有處方和非處方藥物。在使用 CERVIDIL 之前，請一定要告訴您的醫生您目前以及過去的所有醫療情況，包括：

CERVIDIL 是怎樣起作用的？

CERVIDIL 的設計可以直接作用於您的子宮頸以幫助其軟化、變薄及擴張。當您的醫生或助產士認為適當的時候，他或她可以用長拉繩迅速移除 CERVIDIL（就像衛生棉條一樣）。¹

CERVIDIL 和催產素或縮宮素的性質一樣嗎？

不，CERVIDIL 是用於子宮頸成熟，可造成溫和的宮縮。催產素或縮宮素是用於產生或加強現有的宮縮。

我的子宮頸為什麼不能自己成熟？

有時候您的身體需要幫助，因為它無法產生足夠的地諾前列酮，這是一種使身體準備分娩的荷爾蒙。您的醫生或助產士可以決定是否需要 CERVIDIL 的幫助。

CERVIDIL 適合我嗎？

在美國已經使用了超過 5 百萬個 CERVIDIL 陰道插入式產品。³請參閱下面的《重要安全須知》並與您的醫生或助產士討論，只有他們才能決定 CERVIDIL 是否適合您。

- 您的羊水是否破了
- 懷孕期間任何不明原因的陰道出血
- 所有的子宮手術，尤其是先前的剖腹產或宮腔手術
- 持續超過 2 分鐘的宮縮史
- 青光眼
- 氣喘，即使您在兒童時期有過氣喘而在成人期卻沒有氣喘發作

CERVIDIL 最常見的副作用是什麼？

與使用 CERVIDIL 有關的最常見副作用是發生比正常要快許多的宮縮（收縮過速）以及胎兒疲憊或處於窘迫（子宮過度刺激）的徵兆。在臨床試驗中，每 20 個使用 CERVIDIL 的婦女中少於 1 人會單獨或同時出現這些副作用。

在臨床試驗中，每 100 個使用 CERVIDIL 的婦女中少於 1 人會出現發燒、噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛的症狀。

這並不是所有可能的副作用的完整清單。

參考資料：1. Cervidil [包裝插頁]。Parsippany, NJ: Ferring Pharmaceuticals Inc. 2. 美國食品和藥物管理局橘皮書。http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/tempai.cfm。2015 年 8 月 17 日存取。3. 存檔資料。Ferring Pharmaceuticals Inc.

請參看全部的《重要安全須知》以及內附的完整處方資訊。